

Acronistina®

Antifúngico

Nistatina

Vía oral / Tópico oral

- Suspensión
- Solución

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.

Composición

Acronistina® suspensión: Cada mL de suspensión contiene:

Nistatina.....100.000 U.I.
Excipientes: Fosfato de sodio dibásico anhidro; Metilparabeno; Propilparabeno; Sacarina sódica; Glicerol o Glicerina; Carboximetilcelulosa sódica; Alcohol potable; Sucrosa o Azúcar granulada; Polisorbato 80 o tween 80; Esencia de menta líquida; Esencia de fresa polvo; Agua purificada c.s.p.

Acronistina® solución: Cada mL de solución contiene:

Nistatina.....100.000 U.I.
Excipientes: Carboximetil celulosa, Cloruro de sodio c.s.p, Benzoato de sodio, Dióxido de silicio coloidal 200/ Ácido silícico coloidal, Polisorbato/ Tween 80, Sucralosa, Esencia de menta líquida, Esencia de fresa polvo, Agua Purificada c.s.p.

Conservar este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Qué es Acronistina® y para qué se utiliza

Este medicamento está indicado en el tratamiento local de la candidiasis bucofaringea e intestinal causada por cepas sensibles de *Candida albicans*.

Indicaciones

Acronistina® está indicada en profilaxis y tratamiento de infecciones causadas por el hongo *Candida* o *Monilia*, sean éstas por el uso indiscriminado de antibióticos o por infecciones a nivel de la luz intestinal.

No tome / use este medicamento si

- Es alérgico (hipersensible) a la Nistatina.
- Es alérgico a cualquiera de sus excipientes.

Tenga precaución

- En caso de presentar irritación se debe interrumpir el tratamiento.
- Si los signos y síntomas empeoran o persisten después de 14 días visite a su médico.
- Aunque exista una mejoría complete los días de tratamiento indicado por su médico.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica o productos herbales. Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de Nistatina.

Toma / usa de Acronistina® con los alimentos y bebidas

Acronistina® Suspensión lo puede tomar con agua, un alimento blando no ácido como leche o miel.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

Embarazo

Usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

Conducción y uso de máquinas

Acronistina® es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

Cómo tomar / usar Acronistina®

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:

En adultos: 500.000 U.I. tres a cuatro veces al día.

En niños: 100.000 U.I. cuatro veces al día.

En Acronistina® Solución se incluye una válvula aplicadora que debe ser colocada al frasco antes de su primer uso y esta va a permitir aplicar el producto sobre las lesiones. 5 pulverizaciones equivalen a 100.000 U.I.

En el caso de usar Acronistina® Suspensión es necesario agitar antes de usar.

Coloque la mitad de la dosis de la suspensión en cada lado de la boca.

Es importante mantener en la boca el mayor tiempo posible el producto, antes de ingerirlo.

Después de 5 a 10 minutos de aplicar el medicamento se puede retomar la lactancia.

La terapia debe continuar por tres días luego de la desaparición de los síntomas para evitar recaídas.

Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

Uso en niños

El uso de Acronistina® en niños debe ser indicado y controlado por un especialista.

Si toma / usa más Acronistina® de la que debiera

En caso de sobredosis, ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al Servicio de Información Toxicológica.

Recuerde llevar el envase que le quede.

No existe un tratamiento específico para la sobredosis de Nistatina.

Si se produce una sobredosis, debe tratarse al paciente sintomáticamente e instaurar medidas de soporte, según sea necesario.

Si olvidó tomar / usar Acronistina®

Tome / use la dosis olvidada lo antes posible, si pasaron más de 3 horas desde cuando debería haber tomado / usado Acronistina® no tome / use la dosis olvidada y tome/ use la siguiente dosis a la hora indicada. No tome / use una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si interrumpe el tratamiento con Acronistina®

Consulte a su médico antes de interrumpir el tratamiento con Acronistina®

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, Acronistina® puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Se han observado los siguientes efectos adversos:

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): náuseas, vómitos, malestar gastrointestinal y diarrea, especialmente con dosis altas.

En algunos casos se ha comunicado la aparición de rash (erupción cutánea), incluyendo urticaria. Muy ocasionalmente se ha manifestado el síndrome de Stevens-Johnson (caracterizado por alteraciones en la piel, mucosas y ojos). También se han notificado casos de hipersensibilidad (alergia) y angioedema (inflamación de las capas más profundas de la piel), incluyendo edema facial (acumulación de líquido en la cara).

Si considera que experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este documento.

Presentaciones de Acronistina®

Acronistina® Suspensión: Frasco conteniendo 120 mL de suspensión.

Acronistina® Suspensión: Frasco gotero conteniendo 30 mL de suspensión.

Acronistina® Solución: Frasco conteniendo 30 mL de solución + válvula aplicadora.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro. Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

PRODUCTO MEDICINAL.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA.

TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30 °C.

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a www.cimlatam.com o escribanos a contacto@cimlatam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Vigilancia Sanitaria de su país.

Fabricado por Acromax
Laboratorio Químico Farmacéutico S.A
Guayaquil-Ecuador.



INS10217
V.10NI