

BUENOX®

Magaldrato 800 mg

Simeticona 40 mg

Vía oral

• Comprimidos masticables

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.

Composición

Cada comprimido masticable de Buenox® contiene:

Magaldrato (DCI Magaldrato).....800 mg

Simeticona.....40 mg

(Equivalente a 39.6 mg de Dimetilpolisiloxano)

Excipientes: Manitol; Sacarina sódica; Esencia de dulce de leche; Estearato de magnesio; Polietilenglicol 6000.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Qué es Buenox® y para qué se utiliza

Buenox® es una combinación de Magaldrato (neutralizador de la acidez del estómago) y Simeticona (favorece la eliminación de gases).

Buenox® está indicado para el alivio de los síntomas (acidez, pirosis, dolor epigástrico) de úlcera péptica, gastritis, hiperacidez, hernia hiatal, reflujo gastroesofágico, esofagitis por reflujo. Además, está indicado para aliviar las molestias estomacales durante el embarazo.

Precauciones

Se recomienda tener precaución en pacientes con insuficiencia renal y diálisis debido a que el contenido de Aluminio puede incrementar el riesgo de encefalopatía. Además, la elevación del pH gástrico aumenta el riesgo de colonización bacteriana.

La respuesta sintomática al tratamiento no excluye la presencia de patologías orgánicas que requieran tratamiento específico.

Contraindicaciones

Buenox® está contraindicado en:

- Alergia a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Insuficiencia renal severa.
- Obstrucción orgánica del tubo digestivo.

Advertencias

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Uso en embarazo y lactancia

Teniendo en cuenta su baja absorción y en ausencia de insuficiencia renal materna, el riesgo es prácticamente nulo. Se debe intentar limitar la dosis diaria y evitar el uso prolongado. Su uso es compatible con el embarazo y lactancia.

Uso en cardíacos, hipertensos, diabéticos

Buenox® puede ser utilizado en cardíacos, hipertensos y diabéticos.

Efecto sobre la conducción o manejo de máquinas

Buenox® por sus características farmacológicas tiene un efecto nulo sobre la capacidad para conducir o manejar maquinarias.

Interacciones con otros medicamentos

Antes de usar este medicamento, informe a su médico si se encuentra tomando o aplicándose otros productos, así sea los adquiridos sin receta.

Este medicamento puede disminuir la absorción de: Isoniacida, Etambutol, Tetraciclinas, Fluoroquinolonas, Lincosamidas, Antihistamínicos H2, Atenolol, Metoprolol, Propranolol, Cloroquina, Difunisal, Digoxina, Bifosfonatos, sales de Hierro, Fluoruro de Sodio, Glucocorticoides (Prednisolona y Dexametasona), Naproxeno, Indometacina, Ketoconazol, Lansoprazol, Fenotiazinas, Penicilamina, Benzodiacepinas, Dicumarol y Anticolinérgicos. En estos casos se recomienda tomar 2 horas antes o después de Buenox®; aunque para el caso de las Fluoroquinolonas se recomienda distanciar su administración al menos 4 horas. Por alcalinizar la orina puede aumentar la excreción de Salicilatos.

Reacciones adversas

Al igual que todos los medicamentos, Buenox® puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

En la siguiente tabla, las reacciones adversas notificadas con Magaldrato y Simeticona se agrupan según la siguiente clasificación de frecuencias. Muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a <1/10); poco frecuentes (>1/1000 a < 1/100); raras (> 1/10000); frecuencias no conocidas (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).

	Muy frecuentes	Muy raras	Frecuencia no conocida
Trastornos del sistema nervioso central			Neurotoxicidad, encefalopatía*
Trastornos gastrointestinales		Diarrea	Estreñimiento, náuseas, vómitos y dolor abdominal
Trastornos del metabolismo y de la nutrición	Heces blandas	Hipermagnesemia	Hipofosfatemia
Trastornos del sistema inmunológico			Reacciones de hipersensibilidad

*En pacientes con insuficiencia renal y durante tratamientos de larga duración a altas dosis, las sales de Magnesio pueden causar depresión del sistema nervioso central y el Aluminio se puede depositar en particular en el tejido nervioso y óseo, y se puede producir una reducción de fosfatos.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico.

Posología

Adolescentes y Adultos: 1 o 2 comprimidos, 3 o 4 veces por día.

Si olvidó tomar Buenox®

Tome la dosis que olvidó tan pronto como recuerde; pero, si ya casi es hora de la próxima dosis, omita la dosis que no usó y continúe con la dosificación indicada. No tome una cantidad doble para compensar una dosis que olvidó.

Cómo administrar Buenox®

Los comprimidos de Buenox® deben ser masticados o disueltos en la boca antes de ingerirlos, se recomienda que se administren:

- Media a una hora después de las comidas,
- antes de acostarse o
- en el momento de presentar los síntomas.

Si toma más Buenox® del que debe

La intoxicación aguda por Buenox® es muy improbable por sus principios activos, pero en tratamientos muy prolongados y a dosis altas, en pacientes con deterioro de la función renal, puede haber signos de intoxicación crónica por aluminio y/o magnesio. La hiperaluminemia puede manifestarse como osteomalacia, osteoporosis, agravamiento de demencia o encefalopatía. La hipermagnesemia puede manifestarse inicialmente como hiporreflexia y debilidad muscular y en casos graves, puede aparecer hipotensión, bradicardia y parada respiratoria. En el caso de sobredosificación se recomienda comunicar al médico, visitar la casa de salud más cercana y llevar este documento y el envase del producto.

Presentaciones

Buenox® comprimidos masticables: Caja por 20.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro. Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

PRODUCTO MEDICINAL.

VENTA LIBRE.

TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30°C.

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a www.cimlatam.com o escribanos a contacto@cimlatam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Vigilancia Sanitaria de su país.

Fabricado por **Acromax**
Laboratorio Químico Farmacéutico S. A.
Guayaquil-Ecuador.



INS10911
V.10N1