

Ketocon®

Antimicótico

Ketoconazol

Vía oral

• Cápsulas de 200 mg

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.

COMPOSICIÓN

Cada cápsula contiene:

Ketoconazol.....200 mg

Excipientes: Almidón Glicolato de Sodio; Povidona VA-64; Lauril Sulfato de sodio; Alcohol potable; Estearato de magnesio.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.

Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Qué es Ketocon® y para qué se utiliza

Ketocon® es un antimicótico imidazólico usado en el tratamiento de micosis sistémicas y superficiales, así como la profilaxis en pacientes con inmunosupresión o micosis que no responden a otros tratamientos.

Indicaciones

Ketocon® está indicado en:

Infecciones fúngicas sistémicas: Ketoconazol no penetra bien en el sistema nervioso. Por consiguiente meningitis micótica no debe ser tratada con Ketoconazol oral.

• Paracoccidiodomicosis.

• Histoplasmosis.

• Coccidiodomicosis.

• Blastomicosis.

• Cromomicosis.

• Se utiliza también en el tratamiento del Síndrome de Cushing o en aquellos casos en los que no existan otras alternativas, pero su dispensación deberá ser controlada y estrictamente bajo prescripción médica.

No tome este medicamento

Si ha presentado síntomas de alergia a Ketoconazol u otros antifúngicos azólicos.

Si ha presentado síntomas de alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Ketoconazol no debe tomarse con Terfenadina, Astemizol, Cisaprida o Triazolam.

Tenga precaución

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Si ha tenido alguna enfermedad que afecte al hígado o bebe cantidades importantes de alcohol.

Si tiene afectada la función del riñón.

Ketoconazol puede provocar una mayor sensibilidad de los ojos a la luz, por lo que se recomienda que utilice lentes de sol para evitar molestias oculares.

Informe a su médico si está consumiendo medicamentos como Ciclosporina, Tacrolimus.

Realizar exámenes de función hepática al inicio del tratamiento y en forma periódica mientras este dure.

Está contraindicado en pacientes con daño hepático agudo o crónico, y no se debería combinar con sustancias hepatotóxicas.

Evitar combinar el Ketoconazol oral con bebidas alcohólicas.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica o productos herbales.

En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: Astemizol, Cisaprida, Terfenadina, antiácidos, Cimetidina, Famotidina, Nizatidina, Omeprazol, Ranitidina, Alcohol Etilico, Anfotericina B, Warfarina, anticonceptivos orales, Amitriptilina, Fenitoína, Fenobarbital, Diazepam, Alprazolam, Prednisona, Ciclosporina, Didanosina, Loratadina, Propafenona, Rifampicina, Tolbutamida.

Toma de Ketocon® con los alimentos y bebidas

Ketocon® puede ser tomado con o sin los alimentos.

Se recomienda que tome el medicamento en conjunto con las comidas o leche, para evitar problemas estomacales.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

Embarazo

No debe usar Ketocon® si está embarazada o si está intentando quedar embarazada. Durante el tratamiento con

Ketocon® las mujeres que puedan quedar embarazadas deben utilizar un método anticonceptivo seguro.

Lactancia

No debe utilizar Ketocon® si está amamantando.

Conducción y uso de máquinas

Ketocon® no influye en la capacidad para conducir o utilizar maquinaria.

Cómo tomar Ketocon®

Siga exactamente las instrucciones de administración de Ketocon® indicadas por su médico. No cambie la dosis o suspenda el tratamiento sin antes consultar a su médico.

La dosis usual recomendada es:

Tratamiento de la candidiasis vaginal: 200 mg dos veces al día durante 5 días.

Para las demás indicaciones la dosis de Ketoconazol oscila en el rango de 200-400 mg una vez al día, la duración del tratamiento dependerá de la infección a tratar y de la desaparición de los síntomas.

En la medida de lo posible se debe tomar a la misma hora lo cual ayuda a que no olvide tomarlo.

Su médico determinará la duración del tratamiento con Ketocon®

Uso en niños

El uso de Ketocon® en niños debe ser indicado y controlado por un especialista.

Este medicamento está indicado en pacientes pediátricos de dos o más años de edad, y la dosis dependerá de su peso corporal.

Si toma más Ketocon® del que debiera

En caso de sobredosis, ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al Servicio de Información Toxicológica.

Recuerde llevar el envase y los comprimidos que le queden.

No existe un tratamiento específico para la sobredosis de Ketocon®

Si se produce una sobredosis, debe tratarse al paciente sintomáticamente e instaurar medidas de soporte, según sea necesario. Se recomienda el uso de carbón activado para evitar la absorción.

Si olvidó tomar Ketocon®

Tome la dosis olvidada lo antes posible, si pasaron más de 12 horas desde cuando debería haber tomado Ketocon® no tome la dosis olvidada y tome la siguiente dosis a la hora indicada. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si interrumpe el tratamiento con Ketocon®

Consulte a su médico antes de interrumpir el tratamiento con Ketocon®.

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, Ketocon® puede producir efectos no deseados, los cuales solo se producen en un pequeño número de pacientes y su doctor puede controlar la aparición de los mismos. Estos efectos adversos se resuelven usualmente disminuyendo la dosis de este fármaco o bien suspendiendo el tratamiento.

Los efectos no deseados más frecuentes y de escasa entidad son: rash, picazón, fiebre, escalofríos, orina de color oscuro, ritmo cardíaco irregular o acelerado, heces pálidas, náuseas o vómito severos, hinchazón en la cara, garganta o labios, fatiga inusual, sibilancias (respiración ruidosa) o dificultad para respirar, ojos y piel amarillos.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea.

No se alarme por esta lista de posibles efectos adversos. Lo más probable es que no presente ninguno de ellos.

Presentación de Ketocon®

Ketocon® 200 mg: Caja por 10 cápsulas.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

PRODUCTO MEDICINAL.

TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30 °C.

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a www.cimlatam.com o escribanos a contacto@cimlatam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Vigilancia Sanitaria de su país.

Fabricado por Acromax
Laboratorio Químico Farmacéutico S. A.
Guayaquil-Ecuador.



INS11015
V.7