

Lomazol® Forte

Levocetirizina diclorhidrato

Vía oral

• Solución oral

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución oral de Lomazol® Forte contiene:

Levocetirizina diclorhidrato..... 100 mg

Excipientes: Hidróxido de sodio, Benzoato de sodio, Xilitol, Glicerina, Sorbitol, Sucralosa, Saborizante de plátano maduro, Agua purificada c.s.p.

Conservar este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.

Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

¿Qué es Lomazol® Forte y para qué se utiliza?

Lomazol Forte es un medicamento que pertenece al grupo de los antihistamínicos, antagonista potente y selectivo de receptores H1 periféricos. Se utiliza para prevención y tratamiento de síndromes alérgicos cutáneos y de las vías aéreas, tales como: Rinitis alérgica estacional y perenne. Urticaria crónica idiopática.

Contraindicaciones

No tome Lomazol Forte:

- Si es alérgico (hipersensible) a Levocetirizina diclorhidrato o a otros derivados de la piperazina (cetirizina, meclozina); o a cualquier otro componente de la formulación.
- Si padece un deterioro grave de la función renal (insuficiencia renal grave con un aclaramiento de creatinina inferior a 10 ml/min).
- Si el paciente es un niño con insuficiencia renal.

Embarazo y Lactancia

Fertilidad

No hay datos clínicos disponibles de Levocetirizina.

Embarazo

De ser necesario se puede considerar el uso de Levocetirizina durante el embarazo.

Lactancia

Se debe tener precaución en mujeres en periodo de lactancia, porque es probable que exista la excreción por la leche materna.

Advertencias

Si tiene algún factor condicionante que le incapacite para vaciar la vejiga urinaria (como médula espinal dañada o aumento del tamaño de la próstata) ya que levocetirizina puede aumentar el riesgo de retención urinaria. Si es epiléptico o tiene riesgo de convulsiones, por favor consulte a su médico ya que el uso de Lomazol Forte puede agravar las crisis.

Si va a realizarse alguna prueba alérgica, pregunte a su médico si tiene que interrumpir el tratamiento con Lomazol Forte varios días antes. Este medicamento puede afectar los resultados de la prueba alérgica. Es importante no tomar más cantidad de medicación de la prescrita; no duplicar las dosis; tomar con alimentos, agua o leche para minimizar la irritación gástrica.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Precauciones

Se recomiendan bajas dosis en pacientes con cirrosis hepática debido a que el clearance del fármaco se reduce significativamente.

Se recomienda no administrar conjuntamente con depresores del sistema nervioso central, por el potencial riesgo de aumento en la sedación y somnolencia.

Toma de Lomazol Forte con los alimentos y bebidas

Se recomienda precaución si se toma Levocetirizina al mismo tiempo que alcohol, dado que en pacientes sensibles, la toma simultánea de alcohol con antialérgicos del grupo de la Levocetirizina puede potenciar el efecto del alcohol a nivel del sistema nervioso central.

Se pueden tomar Lomazol Forte tanto en ayunas como con los alimentos.

Posología

Niños de 2 a 5 años: 1,25 mg (1,25 mL de solución oral).

Niños de 6 a 11 años: La dosis diaria recomendada es de 2,5 mg (2,5 mL).

Adolescentes a partir de los 12 años y adultos: La dosis diaria recomendada es de 5 mg (5 mL).

Uso en ancianos: Se recomienda ajustar la dosis en ancianos con insuficiencia renal leve a moderada. (ver tabla).

Grupo	Aclaración de creatinina (mL/min)	Dosis y Frecuencia en adultos y mayores de 6 años
Normal	>80	5 mL una vez al día
Leve	50 – 79	5 mL una vez al día
Moderada	30 – 49	5 mL una vez al día cada 2 días
Severa	<30	5 mL una vez al día cada 3 días
Enfermedad renal terminal pacientes que requieren diálisis.	<10	Contraindicado

La duración del tratamiento depende del tipo, duración y curso de los síntomas. Para la fiebre del heno es de 3 a 6 semanas, y en caso de exposiciones al polen durante cortos periodos, una semana puede ser suficiente.

Uso de otros medicamentos

Si bien no se han descrito interacciones ni incompatibilidades con otros medicamentos, siempre es recomendable que informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, la Levocetirizina puede producir efectos no deseados. Esto no significa que suceda en todas las personas.

Los efectos adversos, entre leve y moderados (por sobre el 1%), más frecuentemente descritos son: sequedad de la boca, dolor de cabeza, fatiga y somnolencia. Se observaron otras reacciones adversas poco corrientes (no frecuentes), como astenia o dolor abdominal.

Si aparecen síntomas o signos de hipersensibilidad a la Levocetirizina, suspenda inmediatamente el tratamiento y consulte a su médico. Este cuadro puede incluir: hinchazón de la boca, lengua, cara y/o cuello, dificultad para respirar o tragar junto con habones (angioedema) y disminución de la presión sanguínea (que puede ocasionar pérdida de conocimiento).

Sobredosificación

Los síntomas de sobredosis pueden incluir somnolencia en adultos. En niños inicialmente puede aparecer agitación e inquietud, seguido por somnolencia.

Tratamiento de la sobredosis

No existe ningún antídoto específico conocido contra la levocetirizina.

De producirse sobredosis, se recomienda seguir un tratamiento sintomático o de apoyo. El lavado gástrico se podrá realizar poco después de la ingesta del fármaco. Levocetirizina no se elimina de forma efectiva por hemodiálisis.

Si olvidó tomar Lomazol® Forte

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con Lomazol® Forte

La finalización del tratamiento con Lomazol Forte antes de lo previsto puede asociarse a reaparición progresiva de los síntomas de la enfermedad alérgica. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, consulte a su médico.

Presentaciones de Lomazol® Forte

Caja x frasco x 60 y 120 mL de Solución Oral + Jeringa dosificadora de 5 mL.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro. Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

PRODUCTO MEDICINAL.

VENTA LIBRE.

TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR DE 30 °C. PROTEGIDO DE LA LUZ.

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a www.cimlatam.com o escribanos a contacto@cimlatam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Vigilancia Sanitaria de su país.

Fabricado por **Acromax**
Laboratorio Químico Farmacéutico S. A.
Guayaquil-Ecuador.



INS10270
V.4